

***Streptopelia turtur* Almatà**

El dia 21 de desembre, Joan Carles Bellido va observar una Tòrtora vulgar dins al càmping Almatà, PNAE. Donat que és una citació plenament hivernant, no és d'estranyar pensar en la possibilitat de que fos una Tòrtora oriental *Streptopelia orientalis ssp.* Al migdia del dia 24, els amics Jordi Martí-Aledo i Teresa Montràs, relocalitzaren l'ocell en la mateixa localitat. Varen poder obtenir algunes fotografies, i confirmar de que efectivament es tractava d'una *Streptopelia turtur*. Posteriorment, i a dia 27, he retrobat de nou l'ocell, obtenint un seguit de fotos que correboren l'observació. La similitud amb la Tòrtora oriental, especialment amb la subespècie *meena*, fa que la seva identificació al camp sigui complicada. De fet, aquesta subespècie té caràcters entremitjos entre *orientalis* i *turtur*, tant de volum com de coloració. Només la suma del conjunt de diferents caràcters, serviran per a una identificació correcte. Aquests caràcters són descrits en un recent article [B Ebels, et al. 2010. Oosterse Tortel in Wergea in januari-februari 2010. Dutch Birding 32: 116-125.] i resumits a continuació:

1. Gran extensió de negre al centre de les escapulars i de les cobertores de l'ala, deixant una coloració marró poc extensa al contorn de la ploma. En *turtur*, el negre és menys extens i acabat en punxa, amb marges marrons més extensos.
2. Pit relativament fosc, rosa-marró. Més pàl·lid en *turtur*.
3. Contrast entre el capell gris-marró i el clatell marró. Coloració més uniforme en *turtur*.
4. Les supracobertores caudals són blau-gris, amb una coloració marró molt limitada. Més extensament marró en *turtur*.
5. Les plomes de sota l'ala són gris fosc, més que en *turtur*.
6. L'anell orbital vermell, és molt limitat en *orientalis ssp.*, a diferència de *turtur*, que s'estén més per darrera l'ull.
7. De les rectrius externes, la hemibandera externa és més negra en *orientalis ssp.* que en *turtur*; que és generalment blanca.
8. Contrast difús entre els centres negres i els marges de les escapulars i cobertores de l'ala. En *turtur* el contrast és més nítid.
9. Puntetes pàl·lides a les cobertores mitjanes i grans de l'ala, formant dos distintives bandes alars; absents en *turtur*.

10. Puntetes pàl·lides a les primàries; quasi no visibles en *turtur*.

11. Punta del bec pàl·lida; negre en *turtur*.

12. El barrat del coll, amb bandes negres molt estrets i bandes blau-gris. En *turtur*, les bandes negres són més amples i la resta pàl·lides.

13. Cobertores primàries fosques amb una estreta franja pàl·lida. En *turtur*, són menys fosques i amb una franja pàl·lida extensa.

A Catalunya existeix una citaió prèvia de Tòrtora oriental a la ciutat de Tarragona, del 3 de desembre del 1994. A la resta de la Península Ibèrica n'existexen dos més; una a les illes Columbrets, Castelló, del 30 de setembre del 2001 i l'altre del 30 d'octubre al 6 de novembre del 2005 a Laxe, A Coruña.

A continuació, un seguit de fotografies de la Tòrtora vulgar del càmping Almatà, PNAE.
27/12/2013.





Fotos © Àlex Ollé